ZOLFAST

Anhydride sulfurique (SO3) 82%.

Présentation du produit

- Nom Commercial : ZOLFAST
- Classe du produit : Fongicide liquide biologique contre l'oïdium la rouille et les acariens
- Numéro d'autorisation de vente au Maroc : 1145/DCPT/SPV/BPH/SI
- Type de formulation : Liquide
- Composition chimique : Anhydride sulfurique (SO3) 82%.
- Mode d'action : ZOLFAST assure une protection préventive contre l'oïdium et ceci par une affectation du processus respiratoire chez les champignons et inhibe la germination des spores ainsi que la croissance du mycélium déjà installé superficiellement.
  ZOLFAST permet une action synergique avec l'azote par la limitation du contenu des nitrates dans les tissus végétatifs ce qui favorise la photosynthèse chlorophyllienne.
  ZOLFAST participe dans la formation des aromes essentiels dans les plantes.
  ZOLFAST participe amplement dans la formation des protéines (composant de plusieurs aminoacides comme cystine, méthionine, cystéine.

Efficacité

Culture	Maladie	Dose d'emploi
Poirier, Pêcher, Pommier, Cerisier, Prunier,	Oïdium	1 L/Ha
Agrumes, Olivier, Potager à fruits	Oïdium	1-1,5 L/Ha
Tomate, Pomme de terre, Oignon	Oïdium	1-1,5 L/Ha
Pastèque, Melon, Courgette	Oïdium	1-1,5 L/Ha
Vigne, Raisin de table	Oïdium	1,5-2 L/Ha
Cultures industrielles	Oïdium	1,5-2 L/Ha
Légumes feuillus (Laitue, Roquette, etc.)	Oïdium	2 L/Ha
Pépinières à fruits et Ornementales	Oïdium	0,8-1 L/Ha
Culture florales	Oïdium	80-100 ml/hl

Conditions d'emploi

- Mode d'emploi : ZOLFAST est recommandée pour une pulvérisation foliaire.
- Période et recommandations d'emploi : Sur Vigne : Traiter tous les 14 jours à partir du stade 3-5 feuilles, raccourcir la cadence en cas de forte pression. On conseille trois traitements en cas d'une contamination légère du vignoble par l'oïdium suivant le calendrier ci dessous :
  1er Traitement : Soufre Mouillable 82% (ZOLFAST)
  2éme Traitement : FUNGOMIL
  2éme Traitement : FUNGOMIL
  Sur Cucurbitacées et Cultures Maraîchères : Traiter tout les 7 à 14 jours selon la pression de la maladie.
  Prendre toutes les précautions nécessaires et habituelles d'emploi des spécialités phytosanitaires, Ne pas traiter à une température supérieure à 32°C, Eviter d'appliquer ZOLFAT sur des plants stressés ou sur les jeunes plantations (avant le développement des racines).
  Évitez de mélanger ZOLFAST avec des produits à base de l'oxythioquinox, du captane, du soufre, du chlorothalonil ou d'autres composés chimiquement semblables, en cas d'utilisation avec d'autres produits à base d'huiles, la pulvérisation du traitement doit s'effectuer soit au matin tôt où en fin d'après midi en guise de précaution.

- Conditionnement : 1L et 3 Kg.

AGRO SPRAY TECHNIC, Lot N° 28, Quartier Industriel de Takkadoum- Rabat- Tél :+212.37.63.84.32/75 - Fax :+212.37.63.85.37-
E-mail : ast@agrospraytechnic.ma